

Insecticide

NET WT. 4 LB. (1.8 kg)



READ ENTIRE LABEL BEFORE EACH USE

ECTIONS FOR USE • It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling

For Use on Home Gardens. Not for Use on Plants being grown for Sale or other Commercial Use.

Wearing household latex or rubber gloves, use a dust applicator such as a shaker can, dust gun, puffer or other bulbous duster, rotary duster or other appropriate duster as available. Dust lightly to cover both upper and lower leaf surfaces with a thin, even film of dust. (Many insects hide on the underside of the leaf.) Apply when air is calm to avoid drift and contact with eyes and skin.

Controls a wide range of insect pests. Use at first signs of insect infestation, preferably before damage from feeding occurs. Note the pre-harvest (time between use and harvest) interval with each crop listed.

## IS FOR APPLICATION

COLE CROPS: Brocesoli, Brussel Sprouts, Cauliflower, Chinese Broccoli\* (Gai Lon, White Flowering) \*not for use in California, Collards (For use in AR, AZ, GA, IL, NC, OK, SC & TX only) Pests - Cabbage Looper, Imported Cabbageworm, Diamondback Moth, Cabbage Aphid Remarks - Dust lightly. Apply up to 8 times per season. May be applied until 1 day before harvest. Cabbage, Chinese Cabbage (tight-heading varieties only) Pests - Cabbage Looper, Imported Cabbageworm, Diamondback Moth, Cabbage Aphid Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 times per season. May be applied until 1 day before harvest.

CUCURBIT VEGETABLES: Chayote (Fruit), Chinese Waxgourd, Citron Melon, Cucumber (Gherkin), Gourds (edible include Hyotan, Cucuzza, Hechima, Chinese Okra), Momordica Spp. (includes Balsam Apple, Balsam Pear, Bitter Melon, Chinese Cucumber), Muskmeions (includes True Cantalope, Casaba, Crenshaw, Golden Porshaw, Honeydew Melons, Honey Bells, Mango Melon, Persian Melon, Pineapple Melon, Santa Claus Melon, Snake Melon), Pumpkin, Squash (summer such as Crookneck, Scallop, Straightneck, Vegetable Marrow, Zucchim), Souash (winter such as Butternut, Calabaze, Hubbard, Acom, Spaghetti), Watermelon (includes hybrids) Pests - Leafminer, Squash Bug, Cabbage Looper, Cucumber Beetle (adult), Cutworm, Melon Worm, Pickle Worm, Plant Bug (includes Lygus and Stink Bug), Rindworm, Squash Vine Borer Remarks - Dust lightly. Apply up to 8 times per season. May be applied until harvest.

FRUITING VEGETABLES: Egglant Pests - Colorado Potato Beetle, Vegetable Leafminer, Cabbage Looper, Flea Beetle Remarks - Dust lightly. Apply up to 10 times per season. May be applied until 3 days before harvest. Peppers (Bell) Pests - Pepper Weevil, Vegetable Leafminer, Cabbage Looper, Flea Beetle, European Corn Borer Remarks - Dust lightly. Apply up to 8 times per season. May be applied until 3 days before harvest. Tomatoes Pests - Tomato Fruitworm, Cabbage Looper, Tomato Pinworm, Vegetable Leafminer, Beet Armyworm, Southern Armyworm, Colorado Potato Beetle, Granulate Cutworm, Hornworm Remarks - Dust lightly. Apply up to 6 times per season. May be applied until day of harvest.

LEAFY VEGETABLES (except brassica): Amaranth, Arugula, Cardoon, Celery, Chinese Celery, Celtuce, Chervit, Corn Salad, Chrysanthemum, Edible-leaved Chrysanthemum, Garland, Cress (Garden, Vellow Rocket and Winter), Dandelion, Dock (Sorrel), Endive, Fennel, Lettuce (Head and Leaf), Orach, Parsley, Purslane (Winter and Garden) Radiccio, Rhubarb, Spinach Vine (Malabar Spinach and Indian Spinach), Spinach (New Zealand) Swiss Chard Pests - Vegetable

Winter and Garden) Radiccio, Rhubarb, Spinach, Spinach Vine (Malabar Spinach and Indian Spinach), Spinach (New Zealand) Swiss Chard Pests - Vegetable Leafminer, Cabbage Looper, Cutworm Complex, Fall Armyworm, Beet Armyworm, Corn Earworm, Leafhopper, European Corn Borer Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 times per season. May be applied until 1 day before harvest.

ROOT, TUBER AND BULB VEGETABLES: Onions (Dry bulb and Garlic) Pests - Onion Thrips, Armyworm, Cutworm, Leafminer, Onion Maggot (adult), Stink Bug Remarks - Dust lightly. Apply up to 6 times per season. May be applied until 1 day before harvest. Potatoes Pests - Colorado Potato Beetle, Potato Leafhopper, Aster Leafhopper, Potato Flea Beetle, Potato Aphid, Potato Tuberworm, Potato Psyllid, Cabbage Looper Remarks - Dust lightly. Apply up to 8 times per season. May be applied until 1 day before harvest. Tumips (TX, OX, IL, IN only) Pests - Cabbage Looper, Imported Cabbageworm, Diamondback Moth, Cabbage Aphid Remarks - Dust lightly. Apply up to 4 times per season. May be applied until 1 day before harvest.

CEREAL GRAINS: Sweet Corn Pests - Corn Earworm, European Corn Borer, Fall Armyworm, Southern Armyworm, Corn Rootworm (adult), Cutworm, Aster Leafhopper, Flea Beetle Remarks - Dust lightly. Apply up to 8 times per season. May be applied until 1 day before harvest.

OTHER CROPS: Artichokes Pests - Artichoke Plume Moth Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 times per season. May be applied until 1 day before harvest.

ORNAMENTALS: Asparagus Beetle Remarks - Dust lightly. Apply up to 4 times per season. May be applied until 1 day before harvest.

ORNAMENTALS: Asparagus Beetle Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 times per season. May be applied until 1 day before harvest.

ORNAMENTALS: Asparagus Beetle Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 times per season. May be applied until 1 day before harvest.

ORNAMENTALS: Asparagus Beetle Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 times per season.

ORNAMENTALS: Asparagus Beetle Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 t

Omnivorous Leafroller Remarks - Dust lightly.

TREE CROPS: Dust lightly, using a dust gun or rotary duster. Apple Pests - Navel Orangeworm, Peach Twig Borer Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 times per season. May be applied until 1 day before harvest. Apple Pests - Apple Aphid, Redbanded Leafroller, Obliquebanded Leafroller, Plum Curculio, White Apple Leafhopper, Spotted Tentiform Leafminer, Tarnished Plant Bug Remarks - Dust lightly. Do not apply after petal fall. Avocados Pests - Thrips, Leafhopper, Mirid Bug, Lepidopterous Larvae Remarks - Dust lightly. Apply up to 6 times per season. May be applied until 7 days before harvest. Chemies Pests - Lesser Peachtree Borer, Rose Chafer, Green Fruitworm, Redbanded Leafroller, Plum Curculio, Tarnished Plant Bug Remarks - Dust lightly. Apply when insects appear. In the East: do not exceed 6 applications per season, with no more than 4 applications after petal fall. In the West: do not apply more than 4 applications per season, with no more than 3 applications after petal fall. Fluens Pests - Filbertworm, Obliquebanded Leafroller Remarks - Dust lightly. Apply up to 4 times per season. May be applied until 14 day before harvest. Papaya (For use in Florida only)

Pests - Fruit Fly Remarks - Dust lightly. Apply up to 6 times per season. May be applied until 7 day before harvest. Peachs Pests - Peach Twig Borer, Oriental Fruit Moth, Green Fruitworm, Lesser Peachtree Borer, Plum Curculio, Tarnished Plant Bug, Rose Chafer Remarks - Dust lightly. Apply up to 5 times per season. May be applied until 14 day before harvest. Pears (Dormant) Pests - Pear Psylla Remarks - Dust lightly. Apply up to 2 times per season. May be applied from dormant through bud burst. Pistachios Pests - Pear Psylla, Codling Moth, Green Fruitworm Remarks - Dust lightly. Apply up to 2 times per season. May be applied until 10% hull split. Walnut Pests - Navel Orangeworm, Codling Moth, Walnut Husk Fly Remarks - Dust lightly. Apply up to 8 times per season. May be applied until 10% hull split. Walnut Pe

FOR PET USE - USE ONLY ON DOGS. To control Fleas, Ticks and Lice on dogs, dust animals thoroughly, working the dust into the hair down to the skin. Fay close attention to legs and feet. Use 1/2 oz. on animals 20 pounds and under and 1 oz. on pets over 20 pounds. Avoid getting dust in pet's eyes. Reapply every two (2) weeks as needed. Do not use on dogs under twelve (12) weeks of age. Dust sleeping area including bedding and cracks and crevices.

STORAGE AND DISPOSAL STORAGE: Store in cool, dry place. Do not contaminate feed or foodstuffs by storage or disposal.

DISPOSAL: If empty — Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled — Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS • Hazards to Humans and Domestic Animals • CAUTION: Humans: Harmful if swallowed, inhaled. Avoid breathing dust. Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly with soap and water after handling. Avoid contamination of feed and foodstuffs. Animals: Harmful if swallowed, inhaled. Consult a veterinarian before using this product on debilitated, aged, pregnant or nursing animals or animals on medication. Sensitivities may occur after using ANY pesticide product for pets. If signs of sensitivity occur bathe your pet with mild soap and rinse with large amounts of water. If signs continue, consult a veterinarian immediately.

FIRST AID • If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. If swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Physical and Chamical Hazards • Do not use or store near heat or open flame.

**Physical and Chemical Hazards** • Do not use or store near heat or open flame.

Environmental Hazards • This product is toxic to fish. Do not apply directly to water. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

## JAKUINES RESIDENCIALES

Para usar en jardines residenciales. No se debe usar en plantas cultivadas para la venta u otro uso comercial. Para usar en jardines residenciales. No se debe usar en plantas cultivadas para la venta u otro uso comercial.

Utilizando guantes de goma o látex de uso doméstico, use un aplicador para fumigar, tal como un recipiente o una pistola para fumigar, un vaporizador u otro pulverizador en forma de bulbo, giratorio o de algún otro tipo adecuado que se encuentre disponible. Fumigue moderadamente para cubrir tanto la superficie superior como la inferior de la hoja con una capa delgada y uniforme de polvo. (Muchos insectos se ocultan en el lado inferior de la hoja.)

Aplique cuando no haya viento para evitar el arrastre y que entre en contacto con los ojos y la piel.

Controla una amplia gama de insectos nocivos. Úselo cuando note las primeras señales de infestación por insectos; preferentemente antes de que se produzca el daño que ocasionan al alimentarse. Preste atención al intervalo previo a la cosecha (período entre el uso y la cosecha) de cada cultivo indicado.

# INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

CULTIVOS DE COLES: plagas del brocoli, coles de Bruselas, coliflor, brocoli chino (Gai Lon, florescencia blanca) "no se debe usar en California, coles rizadas (para usar solamente en AR, AZ, GA, IL, NC, OK, SC y TX) — Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), Pieris rapae (Imported Cabbageworm), Plutella xylostella (Diamondback Moth), Brevycorine brassicae (Cabbage Aphid). Observaciones sobre el uso — Furnique moderadamente. Aplique hasta 8 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha. Plagas del coper, Pieris rapae (Imported Cabbageworm), Plutella xylostella (Diamondback Moth), Brevycorine brassicae (Cabbage Aphid). Observaciones sobre el uso — Furnique moderadamente. Aplique hasta 5 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha

de la cosecha.

CUCURBITÁCEAS: plagas del chayote (fruta), calabaza china (Chinese Waxgourd), sandia blanca, pepino (pepinillo), calabazas (las comestibles como las variedades Hyotan, Cucurza, Hechima, Chinese Okra), Momordica Spp. (como las variedades Balsam Apple, Balsam Pear, Bitter Melon y Chinese Cucumber), especies del genero Cucumis (como las variedades True Cantaloupe, Cantaloupe, Casabaz, Crenshaw, Golden Porshaw, Honeydew, Honey Bells, Mango, Persian, Pineapple, Santa Claus, Snake), calabaza Pumpkin, calabaza (las variedades de verano como Crookneck, Scallop, Straightneck, Vegetable Marrow, Zucchini), calabazas (las variedades de invierno como Butternut, Calabaze, Hubbard, Acom, Spaghetti), sandia (incluye las variedades hibridas) – Especies del género Liriomiza (Leafminer), Anasa tristis (Squash Bug), Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), especies del género Acalymma (Cucumber Beetle – adulto), especies de la familia Noctuidae (Cutworm), Diaphania hyalinata (Melon Worm), Diaphania nitidalis (Pickle Worm), insectos de plantas (Plant Bug) (inclusive Lygus y especies de la familia Pentatomidae (Stink Bug)), especies de orugas que se alimentan de la corteza de la sandia (Rindworm), Melittia satyriniformis (Squash Vine Borer). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 8 veces por temporada. Se puede aplicar hasta el dia de la cosecha.

Cosecha.

HORTALIZAS QUE DAN FRUTOS: plagas de las berenjenas — Leptinotarsa decemilineata (Colorado Potato Beetle), género Liriomiza (Vegetable Leafminer), Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), coleópteros entre los que se incluyen los géneros Epithrix, Longitarsus y Phyllotreta (Flea Beetle). Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente; aplique hasta 10 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 3 días antes de la cosecha. Plagas de los pinnentos — Anthonomus eugenii (Pepper Weevil), género Liriomiza (Vegetable Leafminer), Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), coleópteros entre los que se incluyen los géneros Epithrix, Longitarsus y Phyllotreta (Flea Beetle), Ostrinia nubilalis (European Corn Borer). Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente. Aplique hasta 8 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 3 días antes de la cosecha. Plagas de los tomates — Heliothis zea (Tomato Fruitworm), Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), Keiferia lycopersicella (Tomato Pinworm), género Liriomiza (Vegetable Leafminer), Spodoptera exigua (Beet Armyworm), Spodoptera eridiana (Southern Armyworm), Leptinotarsa decemlineata (Colorado Potato Beetle), Feltia subterranea (Granulate Cutworm), Agrius cingulatus (Hormworm)). Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente. Aplique hasta 6 veces por temporada. Se (Homworm). **Observaciones sobre el uso** – Fumigue moderadamente. Aplique hasta 6 veces por temporada. Se ouede aplicar hasta el dia de la cosecha

VERDURAS (excepto el género brassica): plagas del amaranto, arugula, cardo, apio, apio chino, Lactuca vertouras (excepto el genero brassica): piagas del amaranto, arugula, cardo, apio, apio chino, Lactuca sativa var. asparagina L. (Celtuce), perifollo, Valerianella olitoria (Corn Salad), crisantemo con hojas comestibles, guirnaida, berro (de jardin, del genero Barbarea ["Yellow Rocket"] y de inviemo), diente de león, plantas del genero Ramex (acedera), endibia, hinojo, lechuga (repollo y hoja), orzaga, perejil, verdolaga (invierno y de jardin), radicha, ruibarbo, espinaca, plantas del genero Basella (variedades Malabar, Indian), espinaca (Nueva Zelanda), acelga — Especies del genero Liriomiza (Vegetable Leafminer), Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), especies de la familia Noctuidae (Cutworm complex), Spodoptera frugiperda (Fall Armyworm), Spodoptera exigua (Beet Armyworm), Heliothis zea (Corn Earworm), especies de la familia Cicadellidae (Leafhopper), Ostrinia nubilialis (European Corn Bore). Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente. Ablique hasta 5 veces por temporada. Se puede anlicar hasta 1 dia antes de la cosecha.

(Leafhopper), Ostrinia nubilalis (European Com Borer). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 5 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha.

HORTALIZAS DE RAIZ, TUBÉRCULOS Y BULBOS: plagas de la cebolla fuulbo seco y ajo) – Thrips tabaci (Onion Thrips), Pseudaletia unipuncta (Armyworm), especies de la familia Noctuidae (Cutworm), especies del género Liriomiza (Leafminer), Delia antiqua (Onion Maggot – adulto), especies de la familia Pentatomidae (Stink Bug).

Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 6 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha. Plagas de las patatas/papas – Leptinotarsa decenlineata (Colorado Potato Beetle), Empoasca fabae (Potato Leafhopper), Macrosteles quadrilineatus (Aster Leafhopper), Epitrix cucumeris (Potato Flea Beetle), Macrosiphum euphorbiae (Potato Aphid), Phtorimaea operculella (Potato Tuberworm), Paratrioza cockerelli (Potato Psyllid), Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 8 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha. Plagas de los nabos (sólo en TX, OK, IL, UN) – Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), Pieris rapae (Imported Cabbageworm), Plutella xylostella (Diamondback Moth), Brevycorine brassicae (Cabbage Aphid). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 8 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha. Plagas de los nabos (sólo en SC, GA, FL, WA) – Trichoplusia ni. (Cabbage Looper), Hellula undalis (Imported Cabbageworm), Plutella xylostella (Diamondback Moth), Brevycorine brassicae (Cabbage Aphid). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 4 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha.

GRANOS DE CEREALES: plagas del maiz dulce – Heliothis zea (Corn Earworm), Ostrinia nubilalis (European Com Borel), Spodoptera frugiperda (Fall Armyworm), Spodoptera eridiana (Southern Armyworm), Diabrotica virgifera (Corn Rootworm – adulto), especies de la familia Noctuidae (Cutworm), Macrosteles quadrilineatus (Aster Leafhopper), Chaetocnema pulicaria (Flea Beetle). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 6 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha. (En Florida solamente – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 5 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha. Plagas de las alcachofas/alcauciles – Platyptilia cardiudactyla (Artichoke Plume Moth). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 5 veces por temporada. Se puede aplicar hasta el dia de la cosecha. Plagas de los espáragos – Especies de la familia Noctuidae (Cutworm Complex), Crioceris asparagi (Asparagus Beetle). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique hasta 4 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 dia antes de la cosecha.

PLANTAS ORNAMENTALES: plagas de la esparaguera – Popillia japonica (Japanese Beetle), Crioceris asparagi (Asparagus Beetle), Lygus Bug). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique a la etapa de helecho de la planta de espárago después de la cosecha de los brotes, cuando los estadios adultos del Crioceris asparagi (Asparagus Beetle), Lygus Bug). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. Aplique a la etapa de helecho de la planta de espárago después de la cosecha de los brotes, cuando los estadios adultos del Crioceris asparagi (Asparagus Beetle), Lygus hesperus (Lygus Bug) y Popillia japonica (Japanese Beetle) e encuentran presentes. Plagas de los rosales – Spodoprera exigua (Beet Armyworm), Trictioplusia ni. (Cabbage Looper), Platynota stultana (Omnivorous Leafroller). Observaciones sobre el uso – Furnigue moderadamente. GRANOS DE CEREALES: plagas del maiz dulce - Heliothis zea (Com Earworm), Ostrinia nubilalis (European Com

CULTIVOS DE ÁRBOLES: Fumigue moderadamente, utilizando una pistola para fumigar o pulverizador giratorio. Plagas de almendros — Amyelois transitella (Navel Orangeworm), Anarsia lineatella (Peach Twig Borer). Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente. Aplique hasta 5 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 1 día antes de la cosecha. Plagas de los marzanos — Aphis pomi (Apple Aphid), Argyrotaenia velutinana (Redbanded Leafroller), Choristoneura rosaceana (Obliquebanded Leafroller), Conotrachelus nenuphar (Plum Curculio), Typhlocyba pomaria (White Apple Leafhopper), Phyllonorycter blancardella (Spotted Tentiform Leafminer), Lygus lineolaris (Tarnished Plant Bug), Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente. No aplique después de la caída de los petalos. Plagas de los patlos/aguacates — Especies de la familia Miridae (Mirid Bug), larvas de lepidopteros (Lepidopterous Larvae), Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente. Aplique hasta 6 veces por temporada. Se puede aplicar hasta 7 días antes de la cosecha. Plagas de los cerezos — Synanthedon pictipes (Lesser Peachtree Borer), Macrodactylus subspinosus (Rose Chafer), especies de los gêneros Orthosia, Litophane y Amphipyra (Green Fruitworm), Argyrotaenia velutinana (Redbanded Leafroller), Conotrachelus nenuphar (Plm Curculio), Lygus lineolaris (Tarnished Plant Bug), Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente. Aplique cuando aparezcan los insectos. En el Este: no lleve a cabo más de 6 aplicaciones por temporada, con ne más de 4 aplicaciones después de la caída de los petalos. Plagas de los acellanos (Filberts) — Cydia latiferreana (Filbertworm), Choristoneura rosaceana (Obliquebanded Leafroller). Observaciones sobre el uso — Fumigue moderadamente. Aplique hasta 7 días antes de la cosecha. Plagas de los papayos sobre el uso — Fumigue moderadamente. Aplique hasta 7 días antes de la cosecha. Plagas de los papayos sobre el uso — Fumigue moderadamente. Aplique hasta 7 días antes de la cosecha. Plagas de los paparos sobre el uso — Fumigue

PARA USAR EN MASCOTAS – USE SOLO EN PERROS. Para controlar pulgas, garrapatas y piojos en perros, funigue completamente a los animales, haciendo penetrar el poivo a través del pelo hacia la piel. Preste especial atención a las patas y los pies. Use 1/2 onz. en animales que pesen 20 libras o menos y 1 onz. en mascotas de más de 20 libras. Evite que la pulverización entre en contacto con los ojos de la mascota. Vuelva a aplicar cada dos (2) semanas según sea necesario. No lo use en perros de menos de doce (12) semanas de edad. Fumigue la zona donde duerme, incluso la cama, grietas y rajaduras.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco. No contamine el pienso ni los productos alimenticios mediante el almacenamiento o la eliminación. ELIMINACIÓN: Si contamine el pienso ni los productos alimenticios mediante el almacenamiento o la eliminación. El IMINACION: Si el envase está vacfo, no vuelva a utilizarlo. Deséchelo en la basura o puede ofrecerlo para reciclado, si existe esa opción. Si está parcialmente lleno, llame al organismo local que se encarga de los desechos sólidos o al 1-800-CLEANUP para solicitar instrucciones para su eliminación. No elimine nunca el producto sin usar por ningún desagüe interior ni exterior. PRECAUCIONES • Peligroso para los seres humanos y los animales domésticos • PRECAUCIÓN: Seres humanos: Nocivo si se ingiere o aspira. Evite aspirar el polvo. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto. Evite la contaminación del pienso y los productos alimenticios. Animales: Nocivo si se ingiere o aspira. Consulte a un veterinario antes de usar este producto en animales debilidados, de edad avanzada, hembras prenadas o en periodo de lactancia, o en animales sometidos a medicación. Puede aparecer sensibilidad después de usar CUALQUIER producto pesticida para mascotas. Si aparecen signos de sensibilidad, bane a su mascota utilizando un jabón suave y enjuaguela con abundante agua. Si los signos continúan, consulte inmediatamente a un veterinario.

PRIMEROS AUXILIOS • En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y enjuáguelos lenta PRIMIEROS AUXILIOS • En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua durante 15 a 20 minutos. Si está usando lentes de contacto, quiteselos, después de que transcurran 5 minutos, y continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento. En caso de contacto con la piel o la ropa: quitese la ropa contaminada. Enjuague immediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento. Si la persona puede tragar, hágale beber un vaso de agua poco a poco. No induzca el vómito, a menos que se lo indique el centro de toxicología o el médico. No administre nada por la boca a una persona inconsciente. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando lame al centro de toxicología o al médico, o cuando vaya para que le indiquen el tratamiento. PROMISE

RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS . No lo use ni almacene

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE . Este producto es tóxico para los peces. No lo aplique directamente al agua. No contamine el agua mediante la limpieza del equipo o la

ADVERTENCIA: El comprador asume total responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

eliminación de desechos.

Call 1-800-917-5423 Distributed by Chemsico, Div. of United Industries Corp. P.O. Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642 EPA Req. No. 28293-126-9688 EPA Est. Nos. 44616-MO-1, 44616-GA-1, 572-NJ-1, 39578-TX-1, 44616-GA-1, 62793-MO-1, 62793-58996-M0-1(AE), 62908-M0-1(AQ), 9688-M0-1(U) Ace is a trademark of Ace Hardware Corporation. Ace es una marca registrada de Ace Hardware Corporation. Form 7099054C1

Made in the USA for Ace Hardware Corp., Oak Brook, Illinois, 60523, USA ©2002 UIC Fabricado en EE. UU. por Ace Hardware Corp., Oak Brook, Illinois, 60523, EE. UU. ©2002 UIC

All other trademarks and/or artwork are trademarks or copyrights of United Industries Corporation. Todas las demás marcas registradas y/o material gráfico son propiedad de United Industries Corporation.

## The ACE® Promis

PANTEED If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

## El Compromiso de ACE®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

